

Bairro de Jacaré, Rio de Janeiro, Brasil

AVES da Restinga de Jacaré


1

Thayane Braga S. Patusco¹ & Carlos D. M. Ferreira²

¹Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, ²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fotos: Thayane Patusco, exceto nas indicações para fotos de Carlos Ferreira (CF) e Luiz Lopes (LL). Produzido por Thayane Patusco [thayanepatusco@gmail.com] e Carlos Ferreira com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimento: Ao Sr. Luiz Lopes pela disponibilização das fotos. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; Idade - (J) jovem; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2021) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original. [fieldguides.fieldmuseum.org] [1413] versão 1 11/2021




Ainda pouco conhecida, a restinga de Jacaré está localizada no bairro homônimo, situado na divisão dos municípios de Maricá e Saquarema (22°55'31.38"S/42°38'05.96"O), no Rio de Janeiro, Brasil. Os fragmentos de vegetação desta região estão sobre constante ameaça, sofrendo com o avanço urbano que suprime grandes áreas de restinga em curto período de tempo, tornando esses fragmentos cada vez mais escassos e isolados. Apesar do bairro ser relativamente pequeno, com cerca de 27 km² de área total, nesta restinga é observada uma grande diversidade de fisionomias vegetais, algumas destas apresentadas abaixo, que influencia diretamente o alto número de espécies que compõem a avifauna encontrada. Dentro de seus limites, encontram-se quatro fontes principais de água, que exercem papel fundamental na vida silvestre remanescente na região: o Oceano Atlântico, a Lagoa de Jacaré, a Laguna de Saquarema e o Canal Salgado, este último, responsável pela ligação da Lagoa de Jacaré à Laguna de Saquarema, funcionando também como um corredor ecológico. No que se refere à avifauna local, é importante frisar que esta região é uma importante área para a conservação de aves no Brasil, por abrigar uma grande quantidade de espécies, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Aqui, apresentamos algumas das aves mais comuns na região, fotografadas entre os anos de 2013 e 2020.



Halófilpsamófila

(vegetação encontrada na beira da praia, composta por ervas rasteiras, arbustos e poucas arvores).



Manguezal

(mata ciliar do Canal Salgado caracterizada pela presença de mangue-branco (*Laguncularia racemosa* (L.) C. F. Gaertn.), arbustos, árvores e trepadeiras).



Floresta não inundada

(vegetação composta predominantemente por árvores de médio a grande porte).



Floresta inundada

(fragmentos encontrados em poucos pontos do bairro, caracterizado pela presença de caixeta (*Tabebuia cassinoides* (Lam.) DC.), com vegetação herbácea, arbustiva e arbórea).

Bairro de Jacomé, Rio de Janeiro, Brasil

AVES da Restinga de Jacomé

2

Thayane Braga S. Patusco¹ & Carlos D. M. Ferreira²

¹Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, ²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fotos: Thayane Patusco, exceto nas indicações para fotos de Carlos Ferreira (CF) e Luiz Lopes (LL). Produzido por Thayane Patusco [thayanepatusco@gmail.com] e Carlos Ferreira com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimento: Ao Sr. Luiz Lopes pela disponibilização das fotos. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; Idade - (J) jovem; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2021) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1413]

versão 1

11/2021



1 *Rupornis magnirostris*
ACCIPITRIDAE
gavião-carijó (LC)



2 *Rupornis magnirostris*
ACCIPITRIDAE
gavião-carijó (LC) LL



3 *Megaceryle torquata*
ALCEDINIDAE
martim-pescador-grande (LC) (♂)



4 *Amazonetta brasiliensis*
ANATIDAE
pé-vermelho (LC) (♂♀)



5 *Ardea alba*
ARDEIDAE
garça-branca-grande (LC)



6 *Butorides striata*
ARDEIDAE
socozinho (LC)



7 *Butorides striata*
ARDEIDAE
socozinho (LC) (J)



8 *Egretta thula*
ARDEIDAE
garça-branca-pequena (LC)



9 *Cathartes aura*
CATHARTIDAE
urubu-de-cabeça-vermelha (LC)



10 *Cathartes burrovianus*
CATHARTIDAE
urubu-de-cabeça-amarela (LC) CF



11 *Coragyps atratus*
CATHARTIDAE
urubu-de-cabeça-preta (LC) CF



12 *Vanellus chilensis*
CHARADRIIDAE
quero-quero (LC) CF



13 *Columbina talpacoti*
COLUMBIDAE
rolinha-roxa (LC) (♀)



14 *Patagioenas picazuro*
COLUMBIDAE
asa-branca (LC)



15 *Patagioenas picazuro*
COLUMBIDAE
asa-branca (LC)



16 *Crotophaga ani*
CUCULIDAE
anu-preto (LC)

Bairro de Jacomé, Rio de Janeiro, Brasil

AVES da Restinga de Jacomé

Thayane Braga S. Patusco¹ & Carlos D. M. Ferreira²

¹Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, ²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fotos: Thayane Patusco, exceto nas indicações para fotos de Carlos Ferreira (CF) e Luiz Lopes (LL). Produzido por Thayane Patusco [thayanepatusco@gmail.com] e Carlos Ferreira com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimento: Ao Sr. Luiz Lopes pela disponibilização das fotos. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; Idade - (J) jovem; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco preocupante, (VU) Vulnerável.

©Field Museum (2021) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original. [fieldguides.fieldmuseum.org] [1413] versão 1 11/2021



17 *Crotophaga ani*
CUCULIDAE
anu-preto (LC)



18 *Estrilda astrild*
ESTRILDIDAE
bico-de-lacre (LC)



19 *Caracara plancus*
FALCONIDAE
carcará (LC)



20 *Milvago chimachima*
FALCONIDAE
gavião-carrapateiro (LC) (♀) LL



21 *Fregata magnificens*
FREGATIDAE
fragata-comum (LC) (♀) CF



22 *Euphonia chlorotica*
FRINGILLIDAE
fim-fim (LC) (♂) LL



23 *Euphonia chlorotica*
FRINGILLIDAE
fim-fim (LC) (♂) LL



24 *Furnarius rufus*
FURNARIIDAE
joão-de-barro (LC) CF



25 *Pygochelidon cyanoleuca*
HIRUNDINIDAE
andorinha-pequena-de-casa (LC)



26 *Stelgidopteryx ruficollis*
HIRUNDINIDAE
andorinha-serradora (LC)



27 *Stelgidopteryx ruficollis*
HIRUNDINIDAE
andorinha-serradora (LC)



28 *Chrysomus ruficapillus*
ICTERIDAE
garibaldi (LC) (♂)



29 *Chrysomus ruficapillus*
ICTERIDAE
garibaldi (LC) (♀)



30 *Chrysomus ruficapillus*
ICTERIDAE
garibaldi (LC) (J)



31 *Jacana jacana*
JACANIDAE
jaçanã (LC)



32 *Jacana jacana*
JACANIDAE
jaçanã (LC)

Bairro de Jacomé, Rio de Janeiro, Brasil

AVES da Restinga de Jacomé

4

Thayane Braga S. Patusco¹ & Carlos D. M. Ferreira²

¹Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, ²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fotos: Thayane Patusco, exceto nas indicações para fotos de Carlos Ferreira (CF) e Luiz Lopes (LL). Produzido por Thayane Patusco [thayanepatusco@gmail.com] e Carlos Ferreira com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimento: Ao Sr. Luiz Lopes pela disponibilização das fotos. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; Idade - (J) jovem; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2021) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1413] versão 1 11/2021



33 *Mimus saturninus*
MIMIDAE
sabiá-do-campo (LC)



34 *Mimus saturninus*
MIMIDAE
sabiá-do-campo (LC)



35 *Passer domesticus*
PASSERIDAE
pardal (LC) (♂)



36 *Passer domesticus*
PASSERIDAE
pardal (LC) (♀)



37 *Nannopterum brasilianus*
PHALACROCORACIDAE
biguá (LC) (J) CF



38 *Nannopterum brasilianus*
PHALACROCORACIDAE
biguá (LC) (J) CF



39 *Colaptes campestris*
PICIDAE
pica-pau-do-campo (LC) (♂) CF



40 *Dryobates maculifrons*
PICIDAE
pica-pau-anão-barrado (LC) (♂) (J) LL



41 *Picumnus cirratus*
PICIDAE
pica-pau-anão-barrado (LC) (♂)



42 *Aramides cajaneus*
RALLIDAE
saracura-três-potes (LC)



43 *Aramides cajaneus*
RALLIDAE
saracura-três-potes (LC) LL



44 *Gallinula galeata*
RALLIDAE
frango-d'água-comum (LC)



45 *Gallinula galeata*
RALLIDAE
frango-d'água-comum (LC)



46 *Laterallus melanophaius*
RALLIDAE
sanã-parda (LC)



47 *Hemitriccus nidipendulus*
RHYNCHOCYCLIDAE
tachuri-campainha (LC)



48 *Athene cunicularia*
STRIGIDAE
coruja-buraqueira (LC)

Bairro de Jacomé, Rio de Janeiro, Brasil

AVES da Restinga de Jacomé

5

Thayane Braga S. Patusco¹ & Carlos D. M. Ferreira²

¹Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, ²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fotos: Thayane Patusco, exceto nas indicações para fotos de Carlos Ferreira (CF) e Luiz Lopes (LL). Produzido por Thayane Patusco [thayanepatusco@gmail.com] e Carlos Ferreira com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimento: Ao Sr. Luiz Lopes pela disponibilização das fotos. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; Idade - (J) jovem; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2021) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1413] versão 1 11/2021



49 *Athena cunicularia*
STRIGIDAE
coruja-buraqueira (LC)



50 *Formicivora littoralis*
THAMNOPHILIDAE
formigueiro-do-litoral (CR) (♂) LL



51 *Formicivora littoralis*
THAMNOPHILIDAE
formigueiro-do-litoral (CR) (♂)



52 *Formicivora littoralis*
THAMNOPHILIDAE
formigueiro-do-litoral (CR) (♀) LL



53 *Thamnophilus ambiguus*
THAMNOPHILIDAE
choca-de-sooretama (LC) (♂)



54 *Thamnophilus ambiguus*
THAMNOPHILIDAE
choca-de-sooretama (LC) (♀)



55 *Thamnophilus palliatus*
THAMNOPHILIDAE
choca-listrada (LC) (♀)



56 *Coereba flaveola*
THRAUPIDAE
cambacica (LC)



57 *Cyanerpes cyaneus*
THRAUPIDAE
saira-beija-flor (LC) (♂) LL



58 *Dacnis cayana*
THRAUPIDAE
sai-azul (LC) (♂) LL



59 *Dacnis cayana*
THRAUPIDAE
sai-azul (LC) (♀) LL



60 *Ramphocelus bresilius*
THRAUPIDAE
tiê-sangue (LC) (♂)



61 *Ramphocelus bresilius*
THRAUPIDAE
tiê-sangue (LC) (♀) LL



62 *Saltator maximus*
THRAUPIDAE
tempera-viola (LC)



63 *Saltator maximus*
THRAUPIDAE
tempera-viola (LC) LL



64 *Sicalis flaveola*
THRAUPIDAE
canário-da-terra (LC) (♂)

Bairro de Jacomé, Rio de Janeiro, Brasil

AVES da Restinga de Jacomé

Thayane Braga S. Patusco¹ & Carlos D. M. Ferreira²

¹Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, ²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fotos: Thayane Patusco, exceto nas indicações para fotos de Carlos Ferreira (CF) e Luiz Lopes (LL). Produzido por Thayane Patusco [thayanepatusco@gmail.com] e Carlos Ferreira com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimento: Ao Sr. Luiz Lopes pela disponibilização das fotos. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; Idade - (J) jovem; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2021) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/ compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1413] versão 1 11/2021



65 *Sicalis flaveola*
THRAUPIDAE
canário-da-terra (LC) (♂) CF



66 *Sporophila caerulescens*
THRAUPIDAE
coleirinho (LC) (♂)



67 *Tangara cayana*
THRAUPIDAE
saíra-amarela (LC) (♂) LL



68 *Tangara palmarum*
THRAUPIDAE
sanhaçu-do-coqueiro (LC) LL



69 *Tangara peruviana*
THRAUPIDAE
saíra-sapucaia (VU) (♀) LL



70 *Tangara sayaca*
THRAUPIDAE
sanhaçu-cinza (LC)



71 *Volatinia jacarina*
THRAUPIDAE
tiziu (LC) (♂)



72 *Theristicus caudatus*
THRESKIORNITHIDAE
curicaca (LC)



73 *Amazilia fimbriata*
TROCHILIDAE
beija-flor-de-garganta-verde (LC) (♀)



74 *Chlorostilbon lucidus*
TROCHILIDAE
besourinho-de-bico-vermelho (LC) (♂)



75 *Eupetomena macroura*
TROCHILIDAE
beija-flor-tesoura (LC)



76 *Troglodytes musculus*
TROGLODYTIDAE
corruira (LC)



77 *Troglodytes musculus*
TROGLODYTIDAE
corruira (LC)



78 *Turdus amaurochalinus*
TURDIDAE
sabiá-poca (LC)



79 *Turdus leucomelas*
TURDIDAE
sabiá-barranco (LC) LL



80 *Arundinicola leucocephala*
TYRANNIDAE
freirinha (LC) (♀)

Bairro de Jacomé, Rio de Janeiro, Brasil

AVES da Restinga de Jacomé

7

Thayane Braga S. Patusco¹ & Carlos D. M. Ferreira²

¹Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, ²Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Fotos: Thayane Patusco, exceto nas indicações para fotos de Carlos Ferreira (CF) e Luiz Lopes (LL). Produzido por Thayane Patusco [thayanepatusco@gmail.com] e Carlos Ferreira com assistência de Juliana Philipp e Rayane Ribeiro, Field Museum. Agradecimento: Ao Sr. Luiz Lopes pela disponibilização das fotos. Informações adicionais: Status de conservação/ IUCN (www.iucnredlist.org). Legenda: Sexo - (♀) fêmea, (♂) macho; Idade - (J) jovem; IUCN - (CR) Em Perigo, (LC) Pouco preocupante, (VU) Vulnerável.



©Field Museum (2021) CC BY-NC 4.0. Os materiais sob esta licença são livres para uso/

compartilhamento/remixagem com atribuição, mas não permitem o uso comercial da obra original.

[fieldguides.fieldmuseum.org]

[1413] versão 1 11/2021



81 *Fluvicola nengeta*
TYRANNIDAE
lavadeira-mascarada (LC)



82 *Pitangus sulphuratus*
TYRANNIDAE
bem-te-vi (LC)



83 *Tyrannus melancholicus*
TYRANNIDAE
suiriri (LC)